

# Moxidex® Plus

Moxidectina 2 mg – Praziquantel 50 mg

Comprimidos

## Antiparasitario interno de amplio espectro Preventivo de la filariosis

### FÓRMULA:

Cada comprimido contiene: Moxidectina 2 mg. Praziquantel 50 mg.

Agentes de formulación c.s.p. 150 mg.

### PROPIEDADES:

**MOXIDEX PLUS** es un antiparasitario de amplio espectro con actividad sobre parásitos internos de *caninos y felinos* a base de Moxidectina y Praziquantel, el que ha demostrado máximo poder vermífico con una sola toma y ser preventivo de las filarias.

**MOXIDECTINA:** efectiva sobre una alta variedad de nematodos a dosis muy bajas. Su alta liposolubilidad puede ser la causa de la alta eficacia en ciertos estadios parasitarios tales como larvas de *Toxocara* y *Ancylostoma*, las cuales normalmente son refractarias al tratamiento con moléculas más hidrosolubles como levamisol o pirantel.

El mecanismo de acción primario de la moxidectina es afectar la actividad de los canales de cloro en el sistema nervioso de los nematodos y artrópodos. La droga se une a los receptores que incrementan la permeabilidad de la membrana a los iones cloruro, con la consecuente inducción a un estado de reposo irreversible. Esto inhibe la actividad eléctrica de las neuronas en los nematodos y en las células musculares en los artrópodos, produciendo ataxia, parálisis y posterior muerte de los parásitos.

La moxidectina interfiere también en la reproducción de parásitos, causando reducción de la oviposición en garrapatas, y esterilidad de machos y hembras del género *Dirofilaria*.

**PRAZIQUANTEL:** antihelmíntico muy eficaz contra varias especies de cestodos. Produce deterioro de la función de las ventosas y estimula la motilidad del parásito. Fundamentalmente actúa produciendo un cambio en la permeabilidad al  $\text{Ca}^{++}$  de las membranas del parásito, lo que provoca su parálisis y muerte. También ocasiona la vacuolización focal irreversible con la resultante desintegración de los cestodos en sitios específicos del tegumento parasitario.

### INDICACIONES

Prevención y tratamiento de las infestaciones provocadas por:

Nematodos: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Toxocara cati*, *Ancylostoma caninum*, *A. braziliense*, *Uncinaria stenocephala* y *A. tubaeforme*. *Trichuris vulpis*.

Cestodos: *Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis* y *Echinococcus granulosus* en perros.

*Dipylidium caninum* y *Taenia taeniaeformis* en gatos.

Prevención de la Dilofilariosis: *Dirofilaria immitis*.

Los comprimidos pueden administrarse solos o con las comidas, a cachorros a partir de los 30 días de vida o a gatitos a partir de los 45 días de vida.

En hembras preñadas administrar alrededor del día 55 de la gestación, para evitar el desarrollo de los parásitos en los cachorros.

## ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

| Agente                 | Dosificación por comprimido | Tratamiento                   | Prevención          |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ANCYLOSTOMA Y TOXOCARA | 1 comp./10 kg               | 1 toma, repetir a los 15 días | cada 30 días        |
| TRICHURIS              | 1 comp./10 kg               | 1 toma, repetir a los 30 días | cada 30 días        |
| CESTODES               | 1 comp./10 kg               | 1 toma                        |                     |
| DIROFILARIAS           | 1 comp./10 kg               |                               | 1 toma cada 30 días |

## CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO:

A las dosis indicadas no se han encontrado efectos secundarios luego de la administración oral de **Moxidex Plus**. No posee contraindicaciones, el producto puede usarse con otros productos veterinarios, vacunas, antibióticos, analgésicos, anestésicos y productos para el control de pulgas y garrapatas.

El uso de Moxidectina como antiparasitario y preventivo de las filarias no tiene efectos sobre la fertilidad, performance reproductiva, no tiene efectos teratogénicos y no tiene restricciones en hembras preñadas.

## PRECAUCIONES:

No administrar a animales con antecedentes de hipersensibilidad a la moxidectina o al praziquantel, ni a cachorros menores de 30 días o gatitos menores de 45 días. Si se presentaran reacciones de hipersensibilidad o de toxicidad, (vómitos, diarrea, adinamia, ataxia, debilidad, temblores, nerviosismo) suspender la administración y consultar a su veterinario. Se administrará con precaución en razas Collies, Bobtail y razas relacionadas o sus cruas, se recomienda chequear si el paciente presenta o no la deficiencia de Gp-P.

### Preventivo de Filariosis:

Los pacientes deben ser negativos a la dirofilariosis antes de comenzar el tratamiento preventivo con **Moxidex Plus**.

## PRESENTACIONES:

Envases conteniendo 2 Blisters de 3 comprimidos.

Envases conteniendo 5 blisters de 3 comprimidos.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Centro de intoxicaciones 0800 333 0160

Venta bajo receta. Conservar en lugar fresco y seco entre 15 y 25°C.

Vencimiento: 2 años a partir de la fecha de elaboración.

 SENASA - Certificado N°: 11.045

 Establecimiento Elaborador N°: 8473

Laboratorio Mayors Esp. Vet. propiedad de Mayors S.R.L. Inscripción N° 11.305

Dir. Técnico: Dra. Ana M. Robles - Méd. Vet. M.P. 2626

Uso veterinario - Industria Argentina



Andrade 2440 (1832) Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4283-2248

info@mayorslab.com.ar | [www.mayorslab.com.ar](http://www.mayorslab.com.ar)