Proderma

Sulfadiazina de Plata - Betametasona - Vitamina A

Crema cicatrizante, antibiótica bactericida, fungicida, antipruriginosa, antiinflamatoria. Restauradora de tejidos.

COMPOSICIÓN: Cada 100g contiene: Sulfadiazina de Plata 1g, Betametasona 0,1g, Vitamina A 0,25g, excipientes c.s.p.

PROPIEDADES:
Sulfadiazina de Plata: Su acción es bactericida actuando sobre la membrana y la pared celular, debilitándola. Facilita la formación de hernias del protoplasma bacteriano a través de la pared debilitada, lo que luego implica la destrucción bacteriana. No provoca modificaciones importantes en el RNA bacteriano.
Tiene un amplio espectro de actividad e inhibe las principales bacterias responsables de las piodermias superficiales y de las infecciones en las quemaduras. Gram positivas: *Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes* (beta hemolítico). Gram negativas: Se utiliza como antimicrobiano de elección en casos de infecciones por *P. aeruginosa.* Otros gram negativos: *E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Providencia* y *Serratia.* También es activo frente a levaduras y hongos y en especial contra *Candida albicans.*
Betametasona Valerato: Tiene acción Antiinflamatoria, antipruriginosa y vasoconstrictora.
Vitamina A ayuda a regular el crecimiento de los tejidos epiteliales. Interviene en la inducción y el control de la diferenciación epitelial, promoviendo la reepitelización. Tiene acción antiinflamatoria y disminuye la producción de sebo reduciendo diversos procesos dermatológicos pustulares.

El uso de PRODERMA, permite una cicatrización más rápida, aceleración en la eliminación de costras y debridación, reducción de las fases inflamatorias y formación de tejido de granulación con aceleración en la reparación epidérmica.

Especies animales a las que se destina: Caninos, Felinos y Equinos deportivos.

INDICACIONES: ESTÁ ESPECIALMENTE FORMULADA PARA SER APLICADA SOBRE TODAS LAS LESIONES DE PIEL, INFECTADAS o NO INFECTADAS. Profilaxis tópica y tratamiento de infecciones sobre lesiones de la piel, heridas cortantes, infecciones superficiales de la piel, dermatitis piotraumática (parches calientes), picadura de moscas en las orejas, con pérdida de la capa córnea de la piel y el pelo (sangrante o seca). Cicatrización de heridas posquirúrgicas. Quemaduras físicas o químicas. Infecciones del pabellón auricular secundarias a seborreas oleosas o costrosas. Trauma (iatrogénico o auto inducido). Puntos de seborrea, Piodermia pustular diseminada. Heridas ocurridas por mordeduras, atropellamiento, etc. Acné canino (forunculitis y forunculosis del mentón y el hocico). Acné felino. Abrasiones (desgaste por rozamiento). Lesión de los pliegues periorbitales por lagrimeo corrosivo. Pliegues faciales o peribucales. Piodermia estafilocócica superficial. Heridas en general.
En equinos está especialmente indicada en las lesiones del lomo o la cruz producidas por la montura, heridas de la cuartilla, heridas generales que puedan infectarse o ya presenten infección.

MODO DE USO: Aplicar una capa de crema (2 mm) en la zona a tratar 2 veces al día o según criterio profesional, como preventivo en heridas quirúrgicas y como curativo en heridas contaminadas. En heridas infectadas, limpiar y desbridar previamente y luego distribuir una capa fina sobre la herida.

CONTRAINDICACIONES: No usar en dermatitis víricas o tuberculosas.
Se contraindica en pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la crema cicatrizante, en ese caso suspender el tratamiento.
Hipersensibilidad conocida a furosemida, tiacidas, sulfonilureas, inhibidores de la anhidrasa carbónica.
Si la zona a tratar es muy extensa (Mas del 8% de la superficie corporal), por no haber estudios en hembras preñadas, no debe utilizarse durante el embarazo o lactancia.
La absorción varía dependiendo del porcentaje de área de superficie corporal al que se aplica y del grado de daño a los tejidos por tanto, No usar en heridas extensas de más de 1/8 del cuerpo.
No aplicar en los ojos ni en las mucosas orales.

PRECAUCIONES/INTERACCIONES: Se debe tener precaución al utilizar enzimas proteolíticas en forma tópica, simultáneamente con la crema cicatrizante, puesto que la plata podría inactivar tales enzimas.
En animales con disminución de la función renal, hepática o en diabéticos no usar la crema en grandes extensiones y por tiempo prolongado.
Intoxicación en el hombre: En caso de ingestión accidental, el producto no presenta toxicidad. Consultar al médico.

EFECTOS BIOLÓGICOS NO DESEADOS: Los componentes activos, en las condiciones indicadas de uso y teniendo en cuenta las contraindicaciones: No producen efectos adversos.

PRESENTACIONES: Pomos conteniendo 15 y 100 g.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Centro de intoxicaciones 0800 333 0160
Venta bajo receta. Conservar entre 15 y 30°C.
Vencimiento: 2 años a partir de la fecha de elaboración.

SENASA - Certificado Nº: 14-096
Establecimiento Elaborador Nº: 8589

Laboratorio Mayors Especialidades Veterinarias. Propiedad de Mayors S.R.L.
Inscripción Nº: 11.305.
Dir. Téc.: Dra. Ana María Robles. Méd. Vet. M.P. 2626.

Uso veterinario
Industria Argentina

VERSIÓN WEB NO IMPRIMIBLE