

Pruricilona[®] Spray

Fluocinolona acetona 0,2%

Caninos – Felinos

Uso Externo

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contiene:

FLUOCINOLONA ACETONIDA	0.2 %
Excipientes c.s.p.	100 ml.

INDICACIONES:

- Antiinflamatorio cutáneo - uso tópico -
- Tratamiento del prurito e inflamaciones asociadas a dermatosis agudas y crónicas.
- Tratamiento de las alergias, dermatitis húmedas agudas.
- Alivio de condiciones inflamatorias superficiales causadas por abrasiones físicas, químicas y quemaduras.
- Atopias y dermatitis de contacto.
- Condiciones inflamatorias asociadas a otitis externas.
- Picaduras de insectos.
- Lesiones localizadas de pénfigo foliáceo.

Cuando la lesión cutánea no es muy extensa, hasta un octavo de la superficie corporal, pueden utilizarse los corticoides en aplicación local.

Debe comenzarse con las concentraciones máximas efectivas; la droga de elección por mayor penetración epidérmica y menor absorción sistémica y por su potencia, es la acetona de fluocinolona al 0.2%.

En los casos en que exista infección cutánea se agregará antibióticos o quimioterápicos.

En todos los casos, la aplicación se efectuará 2 veces por día. Observándose alivio de los síntomas dentro de las 24 - 48 horas de comenzado el tratamiento.

MODO DE USO:

Rociar hasta humedecer pequeñas cantidades sobre la zona afectada, dos veces al día según respuesta clínica.

Las zonas a tratar no deben superar un octavo de la superficie corporal.

Intervalo entre dosis: Cada 12 horas según respuesta clínica.

La respuesta clínica se obtiene muy rápidamente y el tratamiento no requiere más de 48 a 72 horas de uso continuado.

En casos de alergias crónicas puede repetirse tantas veces como sea necesario siempre y cuando exista supervisión del médico veterinario.

Nota: Para el pénfigo foliáceo se prescribe cada 12 horas en la primera semana, se reduce a una aplicación cada 24 horas en la semana siguiente y cada 48 horas en la tercera semana. Algunos casos se mantienen con aplicaciones 1 o 2 veces por semana.

En otitis externa alérgica se aplica la loción en el canal auditivo y pabellón auricular hasta la remisión de la inflamación. Superada la inflamación reducir la frecuencia de aplicación a días alternos o a una vez por semana como profiláctico.

La fluocinolona está contraindicada en presencia de tuberculosis, infecciones micóticas, y en lesiones cutáneas virales, por lo que en los casos en que exista infección cutánea o bien cuando la misma es muy probable, se agregará antibióticos bactericidas o quimioterápicos.

Usar en cachorros con cautela por posible efecto glucocorticoide.

Los glucocorticoides son antagonistas directos de la insulina; consecuentemente exacerban la diabetes mellitus y no deben usarse en pacientes con dicha enfermedad.

No usar sobre las mucosas oculares.

No administrar sobre zonas infectadas si no se administra un quimioterápico adecuado.

En las condiciones de uso que se recomienda no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios.

Intoxicación y sobredosis en los animales:

Para los animales, el producto no es tóxico a las dosis indicadas.

El uso inadecuado, descontrolado y por largos períodos puede producir síntomas de intoxicación por glucocorticoides

Intoxicación en el hombre:

En caso de ingestión accidental, el producto no presenta toxicidad. Consultar al médico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenar en lugar fresco y seco, entre 15 y 25°C

Vencimiento 2 años.

PRESENTACIÓN:

Frascos con 15 ml de solución

 SENASA - Cert. Número 97036
Establecimiento Elaborador N°: 8473

Laboratorio Mayors Especialidades Veterinarias propiedad de Mayors S.R.L.
Inscripción N° 11.305

Dir. Técnico: Dra. Ana M. Robles - Med. Vet. M.P. 2626

Uso veterinario
Industria Argentina

 **Mayors**
LABORATORIO

Andrade 2440 (1832) Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4283-2248

info@mayorslab.com.ar | www.mayorslab.com.ar