Sosten CG
Inyectable

Condroitín Sulfato 120 mg/ml + Glucosamina 200 mg/ml

Solución estéril inyectable

Regenerador osteoarticular
Promotor de la Condrogénesis
Antiartrósico

VERSION WEB NO COMERCIALIZABLE

COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Condroitin Sulfato 12,00 g (120/o); Glucosamina Sulfato 20,00 g (200/o).
Excipientes C.S.P. 100 ml.
Contiene: 120 mg e/ce de Condroitin Sulfato y 200 mg e/ce de Glucosamina.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
El condroitin y la glucosamina son usados juntos para el tratamiento de los síntomas de la osteoartritis. Como preventivos del desgaste y ruptura de las estructuras del cartílago y como promotores del anabolismo regenerador de las estructuras desgastadas. Estimulante del metabolismo de los condrocitos.
Interviene en la polimerización y regeneración de los proteoglicanos y fibras colágenas. Por la participación conjunta del Condroitin sulfato y la Glucosamina se inhiben las enzimas degradativas y se potencia su efecto antiinflamatorio natural.

INDICACIONES:
- Tratamiento de la Artrosis, Patología degenerativa osteoarticular - (osteoartrosis) - Coxartrosis, Espóndiloartrosis.
- Remodelación de las estructuras deformadas por procesos osteodistróficos durante el crecimiento y desarrollo.
- Procesos de reparación de ligamentos y tendones, fracturas óseas y cartilaginosas.
- Disminuye los efectos secundarios (dolor y deformaciones articulares) en la displasia de cadera en caninos.
- Preventivo de la artrosis y peri-artrosis en los estadios iniciales.
- Tratamiento especifico de los desgastes articulares y artrosis en equinos deportivos.

Especies animales a las que se destina: CANINOS, FELINOS y **EQUINOS DEPORTIVOS**
ORIENTACION DE DOSIFICACION: Aplicar vía subcutánea o intramuscular.
Caninas y Felinas:
Dosis de ataque en casos agudos: Dolor en espóndilo artrosis, compresión medular, dolor y deformaciones articulares en displasia de cadera: 0,5 ce cada 10 kg. de peso, una dosis diaria durante 3 a 4 días.
Dosis para tratamientos prolongados: 0,5 ce c/10 kg dos veces por semana, según criterio profesional. Corresponde a la dosis 6 mg/kg de Condroitin Sulfato y 10 mg/kg de Glucosamina.

Equinos deportivos:
5 ml como dosis media para animales de 400 kg, corresponde a la dosis 1,5 mg/kg de Condroitin Sulfato y 2,5 mg/kg de Glucosamina.
Una aplicación cada 5 días.

En casos agudos: una dosis diaria durante 3 a 4 días, continuando después cada 5 días, hasta remisión de síntomas, según criterio profesional.

El tiempo de administración depende del grado de la artrosis, intensidad de los factores condicionantes de la artrosis secundaria y a la capacidad individual de respuesta.

CONTRAINDICACIONES:
Estas sustancias son componentes naturales del organismo, no son tóxicas, son absorbidas y metabolizadas por las vías naturales. No se ha demostrado ningún efecto tóxico, efectos colaterales o cambios clínicos, bioquímicos o hematológicos por la administración de glucosamina y condroitín sulfato durante 6 meses, a la dosis indicada.

RESTRICCIONES DE USO:
Por no existir experiencia de uso en hembras preñadas, no usar en ese periodo.
No utilizar en procesos infecciosos.
No usar en equinos destinados al consumo humano.
No utilizar en animales con hipersensibilidad a alguno de sus componentes.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenar en lugar fresco y seco, entre 15 y 25°C
Vencimiento 2 años.

FORMAS DE PRESENTACIÓN:
Caja con 1 frasco de 5 ml de solución estéril inyectable.
Caja con 5 frascos de 5 ml de solución estéril inyectable.

VERSION WEB
NO IMPRIMIBLE

- SENASA Cert. Número: 02-224
- Establecimiento Elaborador N°: 8589

Laboratorio MAYORS Esp. Vet. - Inscripción N°: 11.305
Dir. Técnico: Dra. Ana M. Robles - Med. Vet. M.P. 2626

Uso veterinario
Industria Argentina

Andrade 2440 (1832) Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4283-2248
info@mayorslab.com.ar I **www.mayorslab.com.ar**