

Toltrazol[®]

Toltrazuril 200 mg

Comprimidos

COCCIDICIDA de amplio espectro

COMPOSICIÓN:

Toltrazuril 200 mg. Excipientes c.s.p. 750 mg.

PROPIEDADES:

El toltrazuril es un derivado triazínónico, que tiene un amplio espectro anticoccidiósico y actividad antiprotozoaria.

No tiene actividad antibacteriana ni antimicótica. Por lo tanto su acción es específica sobre protozoarios de diferentes especies.

Es utilizado para el tratamiento y la prevención de la coccidiosis en diferentes especies (Conejos, pollos, palomas, halcones, cerdos, vacas, ovejas, cabras, caninos y felinos)

Mecanismo de acción: El Toltrazuril impide el desarrollo de los distintos estadios de los coccidios (fase sexual y asexual) produciendo anormalidades en el aparato de Golgi, retículo endoplasmático y espacio perinuclear, impidiendo la división celular y la formación de la pared del microgameto y del macrogameto. Luego de su administración se absorbe en el intestino delgado, se distribuye por el plasma y los diferentes tejidos (músculo, piel, grasa, hígado y riñones).

La presencia del alimento en el estómago no interfiere en su absorción.

Los metabolitos más importantes del toltrazuril son toltrazuril-sulfóxido y toltrazuril-sulfona, el cual mantiene la actividad antiprotozoaria, es el que persiste por más tiempo y a mayores concentraciones.

Estos metabolitos son producto de la oxidación en el hígado y una mínima cantidad de la droga se metaboliza por hidroxilación. La eliminación del toltrazuril y sus metabolitos en las excretas es lenta. La mayor vía de eliminación es fecal. Solo una pequeña fracción de los metabolitos del toltrazuril se eliminan por orina.

Una sola dosis por vía oral, en el perro, inhibe la liberación de oocystos y los cachorros tratados mantienen negativas sus materias fecales por 2 a 4 semanas.

TOLTRAZOL: Especies animales a las que se destina: **CANINOS Y FELINOS** a partir de los 2,5 kg de peso.

INDICACIONES:

TOLTRAZOL se recomienda para el tratamiento y la prevención de la coccidiosis.

Caninos: *Cystoisospora ohioensis*, *Cystoisospora canis*, *Cystoisospora burrowsi*, *Hammondia heydorni*.

Es altamente efectiva en la reducción de la parasitemia e inclusive en la cura de los animales enfermos con *Hepatozoon canis*.

Otros protozoarios susceptibles: *Cryptosporidium parvum*, *Toxoplasma gondii*, *Neospora caninum*, *Sarcocystis* spp.

Felinos: *Isospora* spp., *Cystoisospora felis*, *Hammondia heydorni*.

MODO DE USO:

Coccidios: Caninos y Felinos: Dosis curativa: 20 mg/Kg. Administración por vía oral. Se puede administrar como única dosis o repetir a los 14 o 21 días si la carga parasitaria del medio ambiente es alta o según criterio profesional.

Dosis preventiva: 20 mg/Kg. administrada en cachorritos a partir de los 20 días de vida en criaderos con alta infestación. Puede repetirse cada 20 días según la carga parasitaria del medio ambiente o según criterio profesional.

COMPRIMIDOS: Cada comprimido de 750 mg contiene 200 mg de Toltrazuril.

1 comprimido para 10 kg de peso.

1/2 comprimido para 5 kg de peso.

1/4 comprimido para 2,5 kg de peso.

Pueden ser administrados solos o con las comidas.

En el caso de coccidiosis intestinal (enfermedad manifiesta) deben ser tratados los síntomas secundarios y puede administrarse junto con Giacoccide para el tratamiento de las disbacteriosis o la presencia de giardias.

Hepatozoon canis: Dosis: 14 mg/kg a 20 mg/kg cada 24 horas, durante 7 días.

CONTRAINDICACIONES:

El toltrazuril presenta un índice terapéutico elevado; sobredosis de 5-10 veces la dosis terapéutica, no produjo efectos colaterales.

Por no haber sido probada la droga en hembras gestantes no se recomienda el uso en ese período.

Para perros y gatos no se han registrado contraindicaciones ni restricciones.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Precauciones que deben adoptarse antes, durante o después de su administración: Ninguna Precaución.

El producto no es tóxico suministrado a las dosis indicadas.

A las dosis recomendadas no hay efectos adversos.

INTOXICACION EN EL HOMBRE:

No hay información disponible sobre la toxicidad de este producto. No es irritante para la piel ni para los ojos. Si contacta con la mucosa ocular enjuagar con abundante agua. No hay un antídoto específico.

- En caso de ingestión accidental, consultar al médico. Centro de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

EFFECTOS BIOLÓGICOS NO DESEADOS:

Toltrazuril no presenta efectos mutagénicos.

No se han encontrado reportes sobre resistencia en agentes patógenos, neurotoxicidad e hipersensibilidad.

PRESENTACIÓN:

Comprimidos birranurados con 200 mg de toltrazuril

-Caja con 1 blister de 3 comp.

-Caja con 5 blisters de 3 comp. c/u.

Venta bajo receta.

Conservar entre 15 y 25°C.

Vencimiento: 2 años.



SENASA Certificado N°: 07-034

Establecimiento Elaborador N°: 8473

Laboratorio MAYORS Especialidades Veterinarias, propiedad de Mayors S.R.L.

Dir. Técnico: Dra. Ana M. Robles - Med. Vet. M.P. 2626

Uso veterinario

Industria Argentina



Andrade 2440 (1832) Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4283-2248

info@mayorslab.com.ar | www.mayorslab.com.ar